baqsimi™
(glukagón) 3 mg nosový prášok

PRÍRUČKA PRE PACIENTA A RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV



BUĎTE PRIPRAVENÍ NA NEBEZPEČENSTVO NÍZKEJ HLADINY CUKRU V KRVI

Ak ste liečení inzulínom, musíte sa pripraviť aj na nebezpečenstvo nízkej hladiny cukru v krvi (závažnú hypoglykémiu).

Nazrite dovnútra a naučte sa viac o nebezpečenstve nízkej hladiny cukru v krvi a o lieku Baqsimi.

Indikácia

Baqsimi je určený na liečbu závažnej hypoglykémie u dospelých, dospievajúcich a detí starších ako 1 rok s diabetom.

Prečítajte si celú Písomnou informáciu pre používateľa a návod na použitie, ktoré sú súčasťou balenia lieku Baqsimi.

Vo vnútri, na strane 6 nájdete dôležité kontaktné informácie.

ČO JE BAQSIMI

- Baqsimi je forma glukagónu, ktorá sa strieka do nosa. Glukagón je prírodný hormón, ktorý sa tvorí v pankrease. Funguje opačným spôsobom ako inzulín a zvyšuje hladinu cukru v krvi.
- Baqsimi je pripravený na použitie a nemusí sa ani miešať ani odmeriavať. Dodáva sa v presne odmeranej dávke.
- Baqsimi nemusíte vdychovať. **Má sa podať v prípade, ak máte veľmi nízku hladinu cukru v krvi, aj vtedy, ak ste v bezvedomí, máte upchatý nos, alebo ak ste užili nosné kvapky.**
- Baqsimi sa nemusí uchovávať v chladničke. Má sa uchovávať pri teplotách do 30 °C.



Pozorne si prečítajte Písomné informácie pre používateľa, ktoré sú súčasťou balenia produktu Baqsimi.

KEDY SA BAQSIMI POUŽÍVA

- Baqsimi sa má podať vtedy, ak sa u vás objaví taká nízka hladina cukru v krvi, že nie ste schopný/á jesť ani piť, a potrebujete pomoc inej osoby.
- Je dôležité, aby ľudia vo vašom okolí vedeli rozpoznať možné príznaky núdzového stavu s nízkou hladinou cukru v krvi a mohli ste sa na nich spoľahnúť, že vám v prípade potreby budú pripravení pomôcť.

K možným príznakom núdzového stavu s nízkou hladinou cukru v krvi patria:

- závraty
- nepozornosť alebo zmätenosť
- záchvat alebo bezvedomie
- výkyvy nálady
- nedostatočná koordinácia
- tras alebo potenie



baqsimi™
(glukagón) 3 mg nosový prášok

AKO SA BAQSIMI POUŽÍVA

Pred použitím Baqsimi si prečítajte návod na použitie.

- Ukážte rodinným príslušníkom a priateľom, kde máte Baqsimi uložený a vysvetlite im, kedy a ako ho treba použiť. **Je dôležité, aby vedeli, ako ho použiť ešte predtým, ako to budete potrebovať.**
- **Neodstraňujte** zmršťovaciu fóliu ani **neotvárajte** tubus, kým nie je potrebné liek použiť. Po otvorení tubusu sa do lieku môže dostať vlhkosť a liek nemusí účinkovať tak, ako sa očakávalo.
- **Nestláčajte** piest predtým, ako budete pripravený podať si dávku. V opačnom prípade miniete jedinú dávku z jednodávkoveho obalu.
- Baqsimi sa nemá používať po dátume exspirácie.

Príprava dávky:

- Odstráňte zmršťovaciu fóliu tak, že odlúpnete červený pásik.
- Otvorte uzáver a vyberte jednodávkový obal z tubusu.




Prečítajte si celú Písomnú informáciu pre používateľa a návod na použitie, ktoré sú súčasťou balenia lieku Baqsimi.

AKO SA BAQSIMI PODÁVA

Podanie dávky:



- **UCHOPTE** jednodávkový obal tak, ako na obrázku. **Nestláčajte piest pred vsunutím do nosa.**



- **VSUŇTE** špičku do jednej nosnej dierky.



- **STLAČTE** piest úplne na doraz tak, aby **nebolo vidno zelený pásik**.

baqsimi™
(glukagón) 3 mg nosový prášok

AKO SA BAQSIMI PODÁVA
(POKRAČOVANIE)

Po podaní dávky:

Ak je osoba v bezvedomí, po podaní Baqsimi ju obráťte nabok.

Okamžite privolajte lekársku pomoc.

Povzbuďte danú osobu, aby čo najskôr skonzumovala niečo s vysokým obsahom cukru, ako napríklad cukrík alebo ovocný džús.

Použitý jednodávkový obal aj tubus zlikvidujte.



Video o tom, **ako správne používať Baqsimi** nájdete na **www.baqsimi.eu**

Hlásenie podozrení na vedľajšie účinky

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa. Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia vigilancie , Kvetná 11, 825 08 Bratislava, **tel.: +421 2 507 01 206**, e-mail: **neziaduce.ucinky@sukl.sk**

Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj spoločnosti Amphastar držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku. Kontaktné údaje nájdete v tabuľke nižšie

Návoz lieku	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Kontakt
Baqsimi	Amphastar France Pharmaceuticals	+421 2/326 062 03 gps@amphastar.com

Odazy a kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky k informáciám v tejto brožúre aleboohľadom bezpečného a účinného používania lieku Baqsimi,kontaktujte spoločnosť Amphastar France Pharmaceuticals na tel. čísle +421 2/326 062 03 aleboe-mailom na gps@amphastar.com

Prečítajte si celú Písomnú informáciu pre používateľa a návod na použitie, ktoré sú súčasťou balenia lieku Baqsimi.

DAJTE INÝM OSOBÁM VEDIEŤ, ŽE MÁTE PRI SEBE BAQSIMI

Karta Baqsimi je navrhnutá tak, aby osobám vo vašej blízkosti umožnila zistiť, čo majú hľadať, aby vám pomohli v prípade hypoglykémie (nízkej hladiny cukru v krvi).

Vyberte si možnosť, ktorá je pre vás najlepšia a majte kartu uloženú na mieste, kde ju iné osoby ľahko nájdu. Nezabudnite na voľný riadok napísať, kde máte Baqsimi uložený.

V PRÍPADE NÍZKEJ HLADINY CUKRU V KRVI HĽADAJTE MALÝ ŽLTÝ TUBUS

MÁM CUKROVKU. KEĎ MI KLESNE HLADINA CUKRU V KRVI, NEDOKÁŽEM SI SÁM POMÔCŤ.

Malý žltý tubus nájdete v/na:

Neotvárajte tubus, kým nie je potrebné liek použiť. Postupujte podľa návodu na použitie a potom privolajte lekársku pomoc.

baqsimi™
(glukagón) 3 mg nosový prášok

baqsimi™

(glukagón) 3 mg nosový prášok



Neotvárajte tubus, kým nie je potrebné liek použiť.

Amphastar France Pharmaceuticals
Usine Saint Charles 60590 Eragny sur Epte
Francúzsko
Tel.: +421 2/326 062 03

ŠÚKL schválil: 08/2025, verzia 2
01-512-01-SK – 08/2025

© 2025 Amphastar