



Behördlich angeordnetes
Informationsmaterial



baqsimi®

(Glucagon) 3 mg Nasenpulver



AUF EINEN NOTFALL MIT SCHWERER HYPOGLYKÄMIE VORBEREITET SEIN

Wenn Sie **Insulin** oder **Sulfonylharnstoffe** einnehmen, müssen Sie auf einen Notfall mit schwerer Hypoglykämie vorbereitet sein.

Lesen Sie diese Broschüre, um mehr über Blutzucker-Notfälle und BAQSIMI® zu erfahren.

Dieses Informationsmaterial wurde als risikominimierende Massnahme durch Swissmedic angeordnet. Es soll sicherstellen, dass Patienten und/oder Angehörige und/oder Betreuungspersonen die besonderen Sicherheitsanforderungen von BAQSIMI® kennen und berücksichtigen.

Die rechtliche Verantwortung für das Informationsmaterial liegt bei Future Health Pharma GmbH.

Indikation

BAQSIMI® ist angezeigt zur Behandlung schwerer Hypoglykämie bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 4 Jahren mit Diabetes mellitus.

ABGABE DURCH DEN ARZT NACH VERSCHREIBUNG.

WAS IST BAQSIMI®?

- BAQSIMI® enthält Glucagon als Pulver, das als Sprühstoss in die Nase gegeben wird.
- Glucagon ist ein natürliches Hormon, das von der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Es wirkt dem Insulin entgegengesetzt und erhöht den Blutzucker.
- BAQSIMI® ist sofort anwendbar und muss nicht vorbereitet werden. Es wird in einem präzisen und vordosierten Applikator geliefert.

Hinweise:

- BAQSIMI® muss nicht eingeatmet werden. **Es kann auch verabreicht werden, wenn Sie bewusstlos sind, eine verstopfte Nase haben oder abschwellende Mittel eingenommen haben.**
- BAQSIMI® braucht nicht in einem Kühlschrank aufbewahrt werden. Es sollte bei Raumtemperatur bis zu 30 °C gelagert werden.
- Es ist wichtig, dass die Personen im Umfeld des Patienten die Anzeichen einer schweren Hypoglykämie erkennen, damit sie vorbereitet sind und der Patient auf ihre Hilfe zählen kann.



WANN BAQSIMI® ZU VERWENDEN IST

- BAQSIMI® wird verwendet, wenn jemand einen Notfall mit schwerer Hypoglykämie hat.

Mild

Blutzucker:
54 mg/dl (3.0 mmol/l)–
70 mg/dl (3.9 mmol/l)

Moderat

Blutzucker:
< 54 mg/dl (3.0 mmol/l)

Schwer

Die betroffene Person kann nicht essen oder trinken und ist auf Fremdhilfe angewiesen (kein Blutzuckerwert definiert).

Mögliche Anzeichen einer schweren Hypoglykämie sind z. B.:



Schwindel



Konzentrationsstörungen
oder Verwirrung



Krampfanfall oder
Bewusstseinsverlust



Stimmungs-
schwankungen



Mangelnde Koordination



Zittern oder schwitzen

WIE MAN BAQSIMI® ANWENDET

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung für BAQSIMI® bevor Sie es benutzen.

- Erklären Sie Ihrer Familie und Ihren Freunden, wo Sie BAQSIMI® aufbewahren und wann und wie man es anwendet. **Sie müssen wissen, wie man es benutzt, bevor es zum Einsatz kommt.**
- Entfernen Sie die Schutzfolie **nicht** und öffnen Sie das Röhrchen erst, bevor es zum Einsatz kommt. **Warum?** Wenn das gelbe Röhrchen geöffnet wurde, kann das Medikament Feuchtigkeit ausgesetzt sein und wirkt möglicherweise nicht wie erwartet.
- Drücken Sie den Kolben **erst**, wenn Sie bereit sind, die Dosis zu verabreichen. **Warum?** Andernfalls geht die Einzeldosis verloren.
- BAQSIMI® sollte nicht über sein Verfallsdatum hinaus verwendet werden.

Vorbereitung:

- Ziehen Sie an dem roten Streifen, um die Schutzfolie zu entfernen.
- Öffnen Sie anschliessend die Kappe und nehmen Sie den Applikator aus dem gelben Röhrchen.



Ziehen Sie die Schutzfolie erst unmittelbar vor der Anwendung ab.

VERABREICHEN DER DOSIS

In 3 einfachen Schritten:

1



- **HALTEN** Sie den Applikator zwischen den Fingern und dem Daumen.

BAQSIMI® enthält nur eine Dosis Glucagon. Drücken Sie **NICHT** den Kolben vor dem Einführen in das Nasenloch.

2



- **FÜHREN** Sie die Spitze des Applikators sanft in eines der Nasenlöcher, bis einer der Finger die Aussenseite der Nase berührt.

3



- **DRÜCKEN** Sie den Kolben vollständig durch, bis die **grüne Linie** nicht mehr zu sehen ist.

NACH VERABREICHEN DER DOSIS

- Wenn die Person bewusstlos ist, drehen Sie die Person auf die Seite, nachdem Sie BAQSIMI® verabreicht haben.
- **Fordern Sie sofort medizinische Hilfe an (144).**
- Sobald die betroffene Person in der Lage ist, sicher zu schlucken, halten Sie diese dazu an, so schnell wie möglich, etwas Zuckerhaltiges zu essen oder zu trinken. Zum Beispiel Traubenzucker oder Fruchtsaft.
- **Entsorgen Sie den gebrauchten Applikator und das Röhrchen im Kehricht.**

Welche Nebenwirkungen kann BAQSIMI® haben?

Die häufigsten Nebenwirkungen sind:



Übelkeit



verstopfte Nase



Erbrechen



Nasenbeschwerden



Kopfschmerzen



Niesen



laufende Nase

ANDEREN HELFEN, ZU WISSEN, DASS SIE BAQSIMI® BEI SICH HABEN

Der BAQSIMI®-Schlüsselanhänger und die BAQSIMI®-Karte sind so gestaltet, dass Personen in Ihrem persönlichen Umfeld wissen, worauf sie achten und wonach sie suchen müssen, um Ihnen bei einer schweren Hypoglykämie zu helfen.

Füllen Sie die Karte aus und bewahren Sie sie dort auf, wo andere sie leicht finden können. Achten Sie darauf, in die vorgesehene Leerzeile zu schreiben, wo Sie BAQSIMI® aufbewahren.



Um ein Video über die Anwendung
von BAQSIMI® anzusehen, fragen Sie
Ihren Arzt oder scannen Sie den QR-Code:



www.baqsimi.ch

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung
von BAQSIMI® haben, wenden Sie sich
an Ihren Arzt oder Apotheker.

Betreuer sollten über die Anwendung
von BAQSIMI® informiert werden und die
Patienteninformation sorgfältig lesen.

Future Health Pharma GmbH
Guyer-Zeller-Strasse 10
8620 Wetzikon

Patient brochure DE v03 09.2026

FUTUREHEALTH 