



Matériel d'information exigé
par l'autorité compétente



baqsimi®

(glucagon) poudre nasale 3 mg



ÊTRE PRÉPARÉ À UNE URGENCE DUE À UNE HYPOGLYCÉMIE SÉVÈRE

Si vous prenez de l'**insuline** ou des
sulfonylurées, vous devez être préparé à une
urgence due à une hypoglycémie sévère.

**Veuillez lire cette brochure pour en savoir plus
au sujet des hypoglycémies sévères et BAQSIMI®.**

Ce matériel d'information a été exigé par Swissmedic au titre de mesure de réduction des risques. Il doit garantir que les patientes et patients et/ou les proches et/ou le personnel soignant connaissent et prennent en compte les exigences particulières en matière de sécurité relatives à BAQSIMI®. La responsabilité juridique du matériel d'information incombe à Future Health Pharma GmbH.

Indication

BAQSIMI® est indiqué dans le traitement d'hypoglycémies sévères chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 4 ans et plus ayant un diabète.

PRESCRIPTION SUR ORDONNANCE DU MÉDECIN.

QU'EST-CE QUE BAQSIMI® ?

- BAQSIMI® contient du glucagon sous forme de poudre qui est pulvérisé dans le nez.
- Le glucagon est une hormone naturelle produite par le pancréas. Il exerce une action contraire à l'insuline et augmente le taux de sucre dans le sang.
- BAQSIMI® est prêt à l'emploi et n'a pas besoin d'être reconstitué. Il est contenu dans un dispositif précis et pré-dosé.

Remarques :

- BAQSIMI® n'a pas besoin d'être inhalé.
Il peut également être administré si vous êtes inconscient, si vous avez le nez bouché ou si vous avez utilisé des décongestionnants.
- BAQSIMI® n'a pas besoin d'être conservé au réfrigérateur. Il devrait être conservé à température ambiante jusqu'à 30 °C.
- Il est important que les personnes de l'entourage du patient sachent reconnaître les signes d'une hypoglycémie sévère, afin qu'elles soient préparées et que le patient puisse compter sur leur aide.



QUAND UTILISER BAQSIMI® ?

- BAQSIMI® est utilisé lorsqu'une personne se trouve dans une situation d'urgence due à une hypoglycémie sévère.

Légère

Glycémie :
54 mg/dl (3,0 mmol/l) -
70 mg/dl (3,9 mmol/l)

Modérée

Glycémie :
< 54 mg/dl (3,0 mmol/l)

Sévère

La personne affectée est incapable de manger ou de boire et dépend de l'aide d'une tierce personne (pas de valeur glycémique définie).

Les signes possibles d'une hypoglycémie sévère sont les suivants :



Étourdissements



Troubles de la concentration
ou confusion



Convulsions
ou perte de connaissance



Sautes d'humeur



Manque de coordination



Tremblements
ou sueurs

COMMENT UTILISER BAQSIMI® ?

Lisez attentivement les instructions d'utilisation de BAQSIMI® avant de l'utiliser.

- Indiquez à votre famille et à vos amis l'endroit où vous conservez BAQSIMI® et expliquez-leur quand et comment l'utiliser. **Ils doivent savoir comment l'utiliser avant d'en avoir recours.**
- Ne retirez **pas** le film de protection et n'ouvrez pas le tube avant d'être prêt à l'utilisation.
Pourquoi ? Si le tube jaune a été ouvert, le médicament peut avoir été exposé à l'humidité et pourrait ne pas agir comme prévu.
- N'appuyez sur le piston **que lorsque que vous êtes prêt** à l'administration de la dose.
Pourquoi ? Sinon, la dose unique sera perdue.
- BAQSIMI® ne doit pas être utilisé au-delà de sa date d'expiration.

Préparation :

- Tirez sur la bandelette rouge pour retirer le film plastique.
- Ouvrez ensuite le couvercle et retirez le dispositif du tube jaune.



**Ne retirez pas le film
de protection avant
l'utilisation.**

ADMINISTRATION DE LA DOSE

En 3 étapes faciles :

1



- **MAINTENEZ** le dispositif entre le pouce et les doigts.

BAQSIMI® ne contient qu'une seule dose de glucagon. N'appuyez **PAS** sur le piston avant de l'insérer dans la narine.

2



- **INSÉREZ** doucement l'embout du dispositif dans l'une des narines jusqu'à ce que l'un des doigts touche l'extérieur du nez.

3



- **APPUYEZ** sur le piston jusqu'au bout, jusqu'à ce que **la ligne verte** ne soit plus visible.

APRÈS ADMINISTRATION DE LA DOSE

- Si la personne est inconsciente, tournez-la sur le côté après avoir administré BAQSIMI®.
- **Contactez immédiatement une assistance médicale (144).**
- Aussitôt que la personne est capable d'avaler sans danger, encouragez-la à manger ou à boire dès que possible quelque chose de très sucré, comme du dextrose ou un jus de fruit.
- **Jetez le récipient et le tube usagés à la poubelle.**

Quels effets indésirables BAQSIMI® peut-il provoquer ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont :



Nausée



Nez bouché



Vomissements



Troubles nasaux



Maux de tête



Éternuements



Nez qui coule

Pour le profil complet des effets indésirables,
voir l'information destinée aux patients BAQSIMI®,
www.swissmedicinfo.ch

AIDER LES AUTRES À SAVOIR QUE VOUS AVEZ BAQSIMI® AVEC VOUS

Le porte-clé et la carte BAQSIMI® sont conçus pour que les personnes de votre entourage sachent ce à quoi elles doivent faire attention et ce qu'elles doivent rechercher pour vous aider en cas d'hypoglycémie sévère.

Remplissez la carte et conservez-la dans un endroit où d'autres personnes peuvent facilement la trouver. Veillez à écrire dans l'espace prévu à cet effet où vous conservez BAQSIMI®.



**Pour regarder une vidéo sur l'utilisation
de BAQSIMI®, demandez à votre
médecin ou scannez le QR Code :**



www.baqsimi.ch

Si vous avez des questions sur
l'utilisation de BAQSIMI®, contactez
votre médecin ou votre pharmacien.

Les proches aidants devraient être informés
de l'utilisation de BAQSIMI® et lire attentivement
les informations destinées aux patients.

Future Health Pharma GmbH
Guyer-Zeller-Strasse 10
8620 Wetzikon

Patient brochure FR v03 09.2026

FUTUREHEALTH 