



Materiale informativo richiesto
dall'autorità competente



baqsimi®

(glucagone) polvere nasale 3 mg



ESSERE PRONTI PER UN'EMERGENZA CON IPOGLICEMIA SEVERA

Se sta assumendo **insulina** o **sulfaniluree**,
deve essere pronto in caso di emergenza
con ipoglicemia severa.

**Legga questo opuscolo per saperne di più sulle
emergenze glicemiche e su BAQSIMI®.**

Il presente materiale informativo è stato richiesto da Swissmedic
come misura di riduzione dei rischi, con l'obiettivo di consentire
ai pazienti e/o ai relativi parenti e/o al personale di assistenza
di conoscere e tenere in considerazione gli specifici requisiti di sicurezza
relativi a BAQSIMI®. La responsabilità legale del materiale informativo
è in capo a Future Health Pharma GmbH.

Indicazioni

BAQSIMI® è indicato per il trattamento dell'ipoglicemia
severa negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età
uguale o superiore a 4 anni con diabete mellito.

CONSEGNA A CURA DEL MEDICO DOPO PRESCRIZIONE.

CHE COS'È BAQSIMI®?

- BAQSIMI® contiene glucagone in polvere da spruzzare nel naso.
- Il glucagone è un ormone naturale prodotto dal pancreas. Funziona in modo opposto all'insulina e aumenta lo zucchero nel sangue.
- BAQSIMI® è pronto all'uso e non deve essere preparato. Viene fornito in un dispositivo preciso e predosato.

Nota:

- BAQSIMI® non deve essere inalato.
Può essere somministrato anche se è incosciente, in caso di congestione nasale o se ha utilizzato dei decongestionanti.
- BAQSIMI® non necessita di essere conservato in frigorifero. Va conservato a temperatura ambiente fino a 30 °C.
- È importante che le persone vicine al paziente riconoscano i segni dell'ipoglicemia severa in modo che siano pronte e possano essergli d'aiuto.



QUANDO SI USA BAQSIMI®?

- BAQSIMI® viene utilizzato quando qualcuno ha un'emergenza con ipoglicemia severa.

Lieve

Glicemia:
54 mg/dl (3,0 mmol/l) -
70 mg/dl (3,9 mmol/l)

Moderata

Glicemia:
< 54 mg/dl (3,0 mmol/l)

Severa

La persona affetta non
è in grado di mangiare o
bere e dipende dell'aiuto di
una terza persona (nessun
livello di glicemia definito)

I possibili segni di ipoglicemia severa includono:



Vertigini



Disturbi della
concentrazione
o confusione



Convulsioni
o perdita
di coscienza



Sbalzi
d'umore



Mancanza di
coordinazione



Tremori o
sudorazione

COME USARE BAQSIMI®?

Legga le istruzioni per l'uso di BAQSIMI® prima di utilizzarlo.

- Spieghi alla sua famiglia e agli amici dove conserva BAQSIMI® e quando e come utilizzarlo.
Dovranno sapere come usarlo prima che lei ne abbia bisogno.
- **Non** rimuova la pellicola protettiva e **non** apra il tubo prima di usarlo.
Perché? Se il tubo giallo è stato aperto, il medicamento potrebbe essere esposto all'umidità e potrebbe non funzionare come previsto.
- **Non** premere il pistone finché non si è pronti per somministrare la dose.
Perché? Altrimenti, la dose singola andrà persa.
- BAQSIMI® non deve essere usato oltre la data di scadenza.

Preparazione:

- Rimuovere la pellicola di plastica tirando la striscia rossa.
- Aprire il coperchio ed estrarre il dispositivo dal tubo giallo.



Non rimuovere la pellicola protettiva finché non si è pronti per la somministrazione.

SOMMINISTRAZIONE DELLA DOSE

In 3 semplici passaggi:

1



- **TENERE** il dispositivo tra le dita e il pollice.

BAQSIMI® contiene una singola dose di glucagone. **NON** premere il pistone prima di inserirlo nella narice.

2



- **INSERIRE** delicatamente la punta in uno narice finché uno delle dita tocca la parte esterna del naso.

3



- **PREMERE** il pistone fino in fondo, finché la **linea verde** non è più visibile.

DOPO LA SOMMINISTRAZIONE DELLA DOSE

- Se la persona non è cosciente, posizionarla su un fianco dopo aver somministrato BAQSIMI®.
- **Chiamare immediatamente l'assistenza medica (144).**
- Non appena la persona è in grado di deglutire in modo sicuro, incoraggiarla a mangiare o bere qualcosa di zuccherato il prima possibile. Ad esempio, glucosio o succo di frutta.
- **Smaltire il dispositivo e il tubo usati nei rifiuti.**

Quali effetti collaterali può avere BAQSIMI®?

Gli effetti collaterali più comuni sono:



Nausea



Naso tappato



Vomito



Disturbi nasali



Cefalea



Starnuti



Naso che cola

Per un profilo completo degli effetti collaterali, vedere l'Informazione destinata ai pazienti di BAQSIMI®
www.swissmedicinfo.ch.

AIUTA GLI ALTRI A SAPERE CHE HA BAQSIMI® CON SÈ

Il portachiavi BAQSIMI® e la scheda BAQSIMI® sono pensati per far sapere alle persone intorno a Lei a cosa prestare attenzione e cosa cercare per aiutarla in caso di ipoglicemia severa.

Compili la scheda e la conservi in un posto in cui gli altri possano trovarla facilmente. Si assicuri di scrivere nell'apposita riga vuota dove conserva BAQSIMI®.



**Per guardare un video sull'uso di BAQSIMI®,
chieda al suo medico o scansioni il codice QR:**



www.baqsimi.ch

Se ha ulteriori domande sull'uso di BAQSIMI®,
si rivolga al Suo medico o al farmacista.

I badanti devono essere informati sull'uso
di BAQSIMI® e leggere attentamente
l'Informazione destinata ai pazienti.

Future Health Pharma GmbH
Guyer-Zeller-Strasse 10
8620 Wetzikon

Patient brochure IT v03 09.2026

FUTUREHEALTH 